



UÄ-tutkimuksen aseptiikka leikkaushaavoissa, kun haava ei ole vielä parantunut

Käytetään aina käsihuuhdetta ennen ja jälkeen tutkimuksen

Käytetään aina suojakäsineitä ja tarvittaessa muita suojaimia

Alle 24 tuntia vanha leikkaushaava: siteiden vaihdossa toimitaan steriilisti (steriilit suojakäsineet, instrumentit ja sidokset)

Yli 24 tuntia vanha leikkaushaava: siteiden vaihdossa ja haavan käsittelyssä käytetään tehdaspuhtaita käsineitä, steriilejä instrumentteja ja sidoksia.

Mahdolliset haavaeritteet tulee puhdistaa pinnoilta välittömästi kloori 1000 ppm liuoksella.

Toiminta leikkaushaavan yhteydessä

Käsien desinfektio alkoholihuuhteella ja puetaan suojakäsineet ennen haavasidoksen poistamista. Haavasidoksen poistamisen jälkeen, haavasidos ja suojakäsineet laitetaan välittömästi huoneen roskapussiin (potilaan sänky ei ole likaisten sidosten säilytyspaikka)

Aseptinen työjärjestys UÄ-tutkimuksessa

- käsien desinfektio
- suojakäsineet
 - steriilit, kun leikkaushaava on alle 24 tuntia
 - epästeriilit, kun leikkaushaava on yli 24 tuntia
- anturipussi
 - steriili, kun leikkaushaava on alle 24 tuntia tai avoin
 - tehdaspuhdasta anturipussia käytetään, jos haava on eritteinen tai infektioitunut
- geeli
 - steriili, kun leikkaushaava on alle 24 tuntia tai avoin
 - tehdaspuhdasta geeliä käytetään, kun leikkaushaava on yli 24 tuntia
- tutkittaessa haava-aluetta
 - edetään puhtaalta alueelta likaisempaan
- tutkittaessa haavan ympäristöä
 - anturipussin vaihto, jos haava-alue on eritteinen
 - jos ympäristöstä palataan takaisin haava-alueelle ja haava on alle 24 tuntia vanha tai avoin, vaihdetaan anturipussi
- suojakäsineiden poisto ja käsien desinfektio

UÄ-tutkimuksen jälkeen asettaessasi haavalle sidoksia, huomioi haavan ikä ja kunto. Tarvittaessa ilmoita vuodeosastolle, että huomioivat haavan, koska röntgenissä ei ole kaikkia tarvittavia haavasidoksia.