

Tiedote LSHP:n potilaiden pneumokokkikonjugaattirokotuksista

Kansallisessa rokotusohjelmassa suositellaan annettavaksi pneumokokkikonjugaattirokote (Prevenar13) kaikille riskiryhmään kuuluville yli 5 vuotta täyttäneille ja aikuisille, joilla on sairautensa tai lääkityksensä vuoksi erityisen suuri riski saada vakava pneumokokki-infektio tai siihen liittyvä komplikaatio

Erityisen suuressa riskissä ovat alla luetellut riskiryhmät. Näiden potilaiden osalta infektio-sairaalahygieniayksikkö ja johtajaylilääkäri ovat tehneet päätöksen, että potilaita hoitavien yksiköiden tulee antaa pneumokokkikonjugaattirokote sairaanhoitopiirin kustantama osana hyvää hoitoa.

Riskiryhmät:

- immuunipuutos
 - perna poistettu tai ei toimi
 - HIV-infektio
 - lymfooma
 - multippeli myelooma
 - nefroottinen oireyhtymä
 - synnynnäinen tai hankittu immuunivajavuus
 - luuydin- ja elinsiirtopotilaat
 - pysyvä systeeminen kortisonihoito tai muu immunosuppressiivinen lääkitys
- likvorifisteli
- kokleaari(simpukka)-implantti

Rokote suositellaan annettavaksi potilaan hoidon yhteydessä hoitavassa yksikössä hoitavan lääkärin arvion perusteella.

Markku Broas
infektiolääkäri

Eva Salomaa
johtajaylilääkäri

Jakelu: kaikki lääkärit
kaikki ylihoitajat
kaikki osastonhoitajat
Tiedoksi: sairaanhoitopiirin johtaja
johtajaylilääkäri
hallintoylihoitaja