



Histamiinialtistus, lasten potilasohje

Tutkimus tehdään keuhkofunktiolaboratoriossa (2. krs.)

Histamiinialtistuksessa mitataan keuhkoputkien supistusherkkyyttä. Puhalluksia tehdään useita kertoja laitteeseen, joka mittaa keuhkojen puhalluskykyä, ja välillä hengitetään sisään testiainetta. Lopuksi annetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä. Tutkimus kestää ½ tuntia.

Huomioitavaa:

Keuhkojen toimintakoe tehdään 2-4 viikkoa hengitystietulehduksen jälkeen (esim. flunssa, poskiontelotulehdus). Jos lapsi sairastuu juuri ennen tutkimusta, ottakaa yhteyttä tutkimuksen siirtämiseksi.

Tutkimusta ennen on oltava 4 tuntia ilman kahvia, teetä, Coca-Colaa tai muita piristäviä juomia sekä tupakoimatta.

Läkkeet lopetetaan seuraavan ohjeen mukaan:

1 vuorokausi ennen tutkimusta

- Airomir	- Buventol	- Lomudal	- Ventoline
- Atro dual	- Bricanyl	- Tilade	
- Atrovent	- Efedrin		
- Atrovent comp			

2 vuorokausi ennen tutkimusta

- Foradil	- Seretide	- Serevent	- Symbicort
- Oxis			

3 vuorokautta ennen tutkimusta

- Aminocont	- Euphyllin retard	- Retafyllin	- Theofol
		- Theo-Dur	- Singulair

5 vuorokautta ennen tutkimusta

- kaikki antihistamiinit esimerkiksi	- Atarax - Zyrtext	- Heinix - Duact	- Aerius - Cetirizin
---	-----------------------	---------------------	-------------------------

Suun kautta otettavat **yskänlääkkeet** lopetetaan 3 vuorokautta ennen tutkimusta.

Keuhkoihin hengitettävien kortisonilääkkeiden käytössä ei ole rajoitusta, ellei hoitava lääkäri anna erityistä ohjetta lääkityksen keskeyttämisestä.

Lisätietoja saa lastensairauksien poliklinikalta puh. (016) 328 3600.

02.2010 Lastensairaudet