



Ennen tekonivelleikkausta toteutettava *Staphylococcus aureus* bakteerikantajuuden vähennys

Tavoitteena on *Staphylococcus aureuksen* aiheuttamien leikkaushaavainfektioiden vähentäminen.

Leikkaukseen tulevalta potilaalta otetaan sieraimista bakteeriviljelynäyte (Pu-BaktVi2) preoperatiivisen haastattelun yhteydessä tai omassa terveyskeskuksessa. Mikäli näyte on positiivinen *S. aureuksen* osalta, toteutetaan alla olevan ohjeen mukaisesti mupirosiini voiteen käyttö ja leikkausta edeltävä ihon pesu klooriheksidiinipesuaineella.

Mupirosiinivoide ja ihonpesuaine lähetetään postissa, jos nenästä otettu näyte on positiivinen.

Mupirosiini 2%:n nenävoiteen (Bactroban nasal) käyttö

Voidetta laitetaan aamuin ja illoin 5vrk:tta ennen leikkausta ja leikkauspäivän aamuna. Sivele voidetta molempien sieraimien etuosan limakalvolle puhtaalla pumpulipuikolla suunnilleen tulitikun pään suuruinen määrä. Lääkkeen laittamisen jälkeen, sulje sieraimet painamalla nenää sivuilta useita kertoja. Muita nenän paikallishoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Bactrobanin kanssa.

Leikkausta edeltävä ihonpesu Bactiscrub 4% klooriheksidiini – pesuaineella

Iho pestään huolellisesti leikkausta edeltävänä iltana ja leikkauspäivän aamuna Bactiscrub-pesuaineella. Levitä geeli suihkussa kostealle iholle ja anna vaikuttaa 3 min ajan, huuhtele iho huolellisesti. Leikkaus- ja taivealueet, ihopoimut, napa sekä nivusten ja genitaalialueen iho tulee pestä huolellisesti. Pesujen jälkeen ei saa käyttää ihovoiteita tai hoitoaineita. Kuivaa vartalo ja hiukset pesun jälkeen puhtaaseen pyyheliinaan. Pukeudu puhtaisiin alusvaatteisiin / yöasuun ja sukkiin. Lisäksi vuodevaatteiden (tyynyliina, alus- ja päällyys- lakanan) tulee olla puhtaat. Tule sairaalaan leikkauspäivän aamuna puhtaissa vaatteissa.

Markku Broas,
ylilääkäri / infektiolääkäri

Samuli Korpi,
osastonylilääkäri / ortopedian erikoislääkäri