



## Spirometriatutkimus, lasten potilasohje

Tutkimus tehdään **keuhkofunktiolaboratoriossa** (2. krs.)

Spirometriatutkimuksessa mitataan keuhkojen puhalluskykyä.

Tutkittava vetää keuhkot täyteen ilmaa ja puhaltaa useamman kerran täydellä teholla spirometrialaitteeseen, joka rekisteröi puhalluksesta esim. uloshengitetyn ilman tilavuuden ja useita eri virtausnopeuksia.

Tutkimus kestää noin puoli tuntia.

### Huomioitavaa

Keuhkojen toimintakoe tehdään vasta **2 viikkoa** hengitystietulehduksen jälkeen (esim. flunssa, poskiontelotulehdus). Jos lapsi sairastuu juuri ennen tutkimusta, ottakaa yhteyttä tutkimuksen siirtämiseksi.

Tutkimusta ennen on oltava **4 tuntia** ilman kahvia, teetä, Coca-Colaa tai muita piristäviä juomia sekä tupakoimatta.

**Jos tutkimuksella halutaan seurata lääkehoidon vaikutusta, tulee määrätyt lääkkeet ottaa ohjeen mukaan.**

**Muuten lääkkeet lopetetaan seuraavan ohjeen mukaan:**

#### 1 vuorokausi ennen tutkimusta

- Airomir	- Atrovent comp	- Lomudal	- Ventilastin
- Atrodual	- Buventol	- Salbutamol	- Ventoline
- Atrovent	- Bricanyl	- Tilade	

#### 2 vuorokausi ennen tutkimusta

- Flutiform	- Oxis	- Seretide	- Serevent
- Foradil		- Symbicort	

#### 3 vuorokautta ennen tutkimusta

- Aminocont	- Montelukast	- Retafyllin	- Singulair
- Efedriini	- Nuelin depot	- Theofol	- yskänlääkkeet

Lisätietoja saatte lastensairauksien poliklinikalta puh. (016) 328 3600.

Lastensairauksien yksikkö