

SUOJAERISTYS

Suojaeristystä käytetään kun potilaan neutrofiilitaso on $< 0.5 \times 10^9 / l$ tai elinsiirrosta on < 1 viikko.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potilashuone | <ul style="list-style-type: none"> - Yhden hengen huone, oma wc ja suihku. - Potilaspapereita tai kannettavaa tietokonetta ei viedä eristysluokkaan. - Ei leikkokukkia tai ruukkukasveja (Neutropenisia potilaita hoitavat osastot). |
| Tutkimus- ja hoitovälineet Laboratorionäytteet ja näytteenottovälineet | <ul style="list-style-type: none"> - Huonekohtainen välineistö potilashoidossa esim. stetoskooppi, verenpainemittari ja kuumemittari. - Näytteenottajilla huonekohtaiset välineet ja välineiden kuljetuskärry. |
| Ruokailu | <ul style="list-style-type: none"> - Kuumennetut ruoat. - Ei probiootteja, tuoresalaatteja, tuorejuustoja, pastöroimattomia tuoremehuja, kotikaljaa ja -simaa, kuumentamattomia pakastemarjoja, yrttimauste-seoksia, pähkinöitä, kuorimattomia hedelmiä tai vihanneksia. |
| Henkilökunta | <ul style="list-style-type: none"> - Hyvä käsihygienia, kts. LSHP:n käsihygieniaohje - Lähihoidossa suojakäsineet. Muista käsien desinfektiohieronta aina ennen käsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen. - Infektoituneena ei saa hoitaa potilasta. |
| Potilaan ja omaisten ohjaus | <ul style="list-style-type: none"> - Potilaalle kerrotaan suojaeristyksestä ja hyvän käsihygienian merkityksestä - Potilaan liikkuminen huoneen ulkopuolella hoitavan lääkärin arvion mukaan. Potilas käyttää suu-nenäsuojusta liikkeessään huoneen ulkopuolella. - Omaisten on ilmoitauduttava ensimmäisellä kerralla osaston henkilökunnalle saadakseen ohjeita käsihygienian toteuttamisessa ja suojainten käytössä. |
| Potilaan kuljettaminen | Potilaalla suu-nenäsuojus kuljetuksen ajan |
| Päivittäinen ylläpitosiivous | Siivous potilashuoneista ensimmäisenä. |
| Suojaeristuksen kesto | Neutropeniavaiheen ajan tai kunnes elinsiirrosta on > 1 viikko. Eristyksen lopettamisesta päättää hoitava lääkäri. |

Hygieniatyöryhmä hyväksynyt ohjeen 23.2.2015